

HCG 180UI


HCG 180UI

HCG 180UI	1 frasco pó liofilizado
Cloreto de Sódio 0,9%	1 ampola 1mL

HCG 180UI + FORMULAÇÃO ANSIOLÍTICA

HCG 180UI	1 frasco pó Liofilizado
Taurina 10% + Inositol 10%	3 ampolas 2mL
Fenilalanina 2,5%	1 ampola 2mL
Procaína 4%	1 ampola 2mL

VIA DE ADMINISTRAÇÃO: INTRAMUSCULAR OU SUBCUTÂNEA



Intramuscular: Quadrante superior externo do glúteo

- Agulha para aspiração: 30x0,8mm
- Agulha para aplicação: 30x0,7mm
- Seringa: 1mL



Subcutânea: Região abdominal

- Agulha para aspiração: 30x0,8mm
- Agulha para aplicação: 13x0,3mm
- Seringa: 1mL ou 10mL

COMPONENTES DA FORMULAÇÃO ANSIOLÍTICA

Taurina + Inositol	Efeito ansiolítico, atua como agente modulador da ansiedade
Fenilalanina	Precursor de tirosina, a tirosina aumenta a produção de dopamina e melatonina. Aumenta a produção de CCK (colecistoquinina), fator sacietogênico.
Procaína	Anestésico local

Opção	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado	Domingo	Tratamento	Quantidade
1	125UI	125UI	125UI	125UI	180UI	-	125UI SL	6 semanas = 40 dias	125UI = 24 doses 180UI = 6 doses 125UI sublingual = 5 doses
2	125UI	125UI	125UI	125UI	180UI + formulação ansiolítica	-	125UI SL	6 semanas = 40 dias	125UI = 24 doses 180UI + formulação ansiolítica = 6 doses 125UI SL = 5 doses
3	180UI	-	180UI	-	180UI	-	125UI SL	6 semanas = 40 dias	180UI = 18 doses 125UI sublingual = 5 doses

APLICAÇÕES

Dia 1-2	Inicia-se a aplicação de HCG + Aumento da ingestão de calorias para 2400 calorias ou mais
Dia 3-40	Aplicações de HCG + Dieta de 500 calorias
Dia 41-43	Dieta de 500 calorias sem aplicações de HCG

PÓS-TRATAMENTO

Durante 3 semanas após o tratamento todas as comidas são permitidas exceto carboidrato e açúcar em qualquer forma (incluindo frutas muito doces).

Após essas 3 semanas adiciona-se gradualmente carboidratos em pequenas quantidades.

NOVOS TRATAMENTOS

TRATAMENTOS	INTERVALOS
1º para o 2º	Mínimo de 6 semanas
2º para o 3º	8 semanas
3º para o 4º	12 semanas
4º para o 5º	20 semanas
5º para o 6º	6 meses

PROCEDIMENTO PARA APLICAÇÃO HCG 180UI

- Realizar assepsia no local com álcool 70°
- Aspirar o conteúdo da ampola de Cloreto de Sódio (agulha 30x0,8mm)
- Transferir para o frasco de HCG, com cuidado para não formar bolhas. Solubilizar
- Aspirar o conteúdo do frasco
- Realizar a troca da agulha conforme a via de administração a ser realizada (intramuscular: 30x0,7mm ou subcutânea: 13x0,3mm)
- Aplicação intramuscular: aplicar no quadrante superior externo do glúteo
- Aplicação subcutânea: pinçar com os dedos a região abdominal e realizar a aplicação

PROCEDIMENTO PARA APLICAÇÃO HCG 180UI + FORMULAÇÃO ANSIOLÍTICA

- Realizar assepsia no local com álcool 70° e delimitação das regiões
- Aspirar o conteúdo da primeira ampola (agulha 30x0,8mm)
- Transferir para o frasco de HCG, com cuidado para não formar bolhas. Solubilizar
- Aspirar o conteúdo das demais ampolas da esquerda para a direita, devido ao pH das soluções (da mais alcalina para a mais ácida)
- Transferir para o frasco com cuidado para não formar bolhas. Homogeneizar
- Aspirar o conteúdo do frasco e trocar a agulha para 13x0,3mm
- O volume total da solução é de 10mL
- Aplicar na região abdominal 0,2 a 0,3mL da solução por ponto em um espaçamento médio de 1cm, agulha com angulação de 90°

OBSERVAÇÕES

- Não realizar a aplicação do produto caso haja turvação e/ou precipitação da solução.
- Após a solubilização, a formulação deverá ser aplicada imediatamente
- Não é recomendada a aplicação de HCG durante o ciclo menstrual. No período menstrual, manter somente a dieta, após o fim da menstruação, voltar a realizar as aplicações
- Mulheres devem iniciar o tratamento após o término do período menstrual
- Não ingerir bebida alcoólica durante o tratamento
- Não realizar atividade física durante o tratamento. Caso realize, aumentar a ingestão para 1200 calorias
- Não utilizar maquiagens e cremes
- Avaliar o risco do paciente em desenvolver coágulos sanguíneos

ATENÇÃO!

- A Fenilalanina é contraindicada para pacientes com fenilcetonúria

ASSOCIAÇÃO:

- HCG 125UI sublingual

DIETA DE 500 CALORIAS

Café da manhã	Ingerir suco de 1 limão 1 Torrada + Café ou Chá sem açúcar ou com adoçante não calórico.
Lanche da manhã	1 maçã grande ou 1 laranja grande ou ½ grapefruit ou 1 punhado de morangos.
Almoço	- 100 gramas de Carne bovina, vitela, frango, peixe branco, lagosta, caranguejo ou camarão. - Escolha apenas 1 dos vegetais permitidos: aipo, acelga, aspargo, folhas de beterraba, cebola, chicória, couve, espinafre, funcho, pepino, rabanete vermelho, tomate, salada verde e verduras. - Carnes cozidas ou Grelhadas. - Carnes pesadas cruas e sem gordura. - 100 gramas de queijo branco light, ovo cozido, como substituinte da carne.
Lanche da tarde	1 maçã grande ou 1 laranja grande ou ½ grapefruit ou 1 punhado de morangos.
Jantar	Igual ao almoço

OBSERVAÇÕES

Adoçantes permitidos	Stévia ou sacarina.
Temperos permitidos	Sal, pimenta, vinagre e mostarda em pó, alho, manjeriço, manjerona, salsa e tomilho.
Bebidas permitidas	Beber pelo menos 2 litros de água por dia. Café e chá sem açúcar ou com adoçante não calórico pode ser usado livremente. Uma colher de leite desnatado por dia.

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA:

- A.T.W. SIMEONS. Pounds & Inches - A NEW APPROACH TO OBESITY. 1971

Este documento foi elaborado com informações encaminhadas por nossos fornecedores e/ou pesquisadas em literaturas científicas, com o objetivo de orientar o profissional de saúde, devendo sempre ser analisadas pelo médico. Recomenda-se a pesquisa em outras referências científicas para a escolha da melhor conduta terapêutica.