


EMAGRECIMENTO II

EMAGRECIMENTO II PH 5,64

L-Carnitina 300mg/mL	1 ampola 2mL
Procaína 4% + Cafeína 5%	1 ampola 2mL
Inositol 10% + L-Taurina 10%	3 ampolas 2mL

Solução límpida incolor

VIA DE ADMINISTRAÇÃO: INTRAMUSCULAR



- Aplicação no quadrante superior externo do glúteo
- Agulha para aspiração: 30x0,8mm
- Agulha para aplicação: 30x0,7mm
- Seringa: 10mL

INDICAÇÃO

- Auxiliar no tratamento de emagrecimento
- Aumento do metabolismo
- Aumento da quebra de gordura
- Ação ansiolítica

COMPONENTES

L-Carnitina	Aumento da quebra de gorduras. Acelera o metabolismo
Procaína	Anestésico local
Cafeína	Termogênico. Acelera o metabolismo
Taurina + Inositol	Efeito ansiolítico, atua como agente modulador da ansiedade

PROTOCOLO


Realizar a aplicação intramuscular uma vez por semana ou a cada 72 horas. A duração do tratamento pode variar entre 8 a 12 semanas de acordo com o objetivo.

PROCEDIMENTO PARA APLICAÇÃO

- Realizar assepsia do local com álcool 70°
- Aspirar o conteúdo das ampolas da esquerda para a direita, devido ao pH das soluções (da solução mais alcalina para a mais ácida). (Agulha 30x0,8mm)
- Trocar a agulha para 30x0,7mm
- O volume total da solução é de 10mL, realizar duas aplicações contendo 5mL da solução
- Aplicar 5mL da solução no quadrante superior externo de cada glúteo

OBSERVAÇÕES

- Não realizar a aplicação do produto caso haja turvação e/ou precipitação da solução.
- Após a solubilização, a formulação deverá ser aplicada imediatamente.



Este documento foi elaborado com informações encaminhadas por nossos fornecedores e/ou pesquisadas em literaturas científicas, com o objetivo de orientar o profissional de saúde, devendo sempre ser analisadas pelo médico. Recomenda-se a pesquisa em outras referências científicas para a escolha da melhor conduta terapêutica.