

GORDURA LOCALIZADA I

GORDURA LOCALIZADA I PH 5,54

Hialuronidase 3000UTR	1 frasco pó liofilizado
Benzopirona 1,5mg/mL	1 ampola 2mL
Troxerrutina 5%	2 ampolas 2mL
Procaína 4% + Cafeína 5%	1 ampola 2mL


Solução límpida amarelada

VIA DE ADMINISTRAÇÃO: SUBCUTÂNEA

- A aplicação deve ser realizada nos locais com gordura localizada
- Agulha para aspiração: 30x0,8mm
- Agulha para aplicação: 13x0,3mm
- Seringa: 10mL

INDICAÇÃO

Diminuição da gordura localizada



COMPONENTES

Hialuronidase	Fator de difusão. Auxilia na passagem de líquidos injetáveis, aumentando sua absorção e velocidade de penetração
Benzopirona	Atua no sistema circulatório e linfático
Troxerrutina	Melhora da microcirculação
Cafeína	Termogênico. Acelera o metabolismo
Procaína	Anestésico local

PROTOCOLO

Realizar a aplicação subcutânea uma vez por semana ou a cada 72 horas. A duração do tratamento pode variar entre 8 a 12 semanas de acordo com o objetivo.

PROCEDIMENTO PARA APLICAÇÃO

- Realizar a assepsia do local com álcool 70° e a delimitação das regiões
- Aspirar o conteúdo da primeira ampola (agulha 30x0,8mm)
- Transferir para o frasco contendo Hialuronidase liofilizada com cuidado para não formar bolhas (agulha na diagonal para que o líquido escorra pela parede do frasco)
- Solubilizar com cuidado
- Aspirar o conteúdo das demais ampolas da esquerda para a direita, devido ao pH das soluções (da mais alcalina para a mais ácida)
- Transferir para o frasco com cuidado para não formar bolhas. Homogeneizar
- Aspirar o conteúdo do frasco e trocar a agulha para 13x0,3mm
- O volume total da solução é de 8mL
- Aplicar nos locais com gordura localizada 0,2 a 0,3mL da solução por ponto e um espaçamento médio de 1cm, agulha com angulação de 90°

OBSERVAÇÕES

- Não realizar a aplicação do produto caso haja turvação e/ou precipitação da solução
- Após a solubilização, a formulação deverá ser aplicada imediatamente
- Em alguns casos, a Hialuronidase pode causar alergia. Para reduzir o risco de reações alérgicas, recomenda-se não ingerir carne vermelha por 12 horas antes da aplicação e 24 horas após a aplicação
- Durante o tratamento, é recomendado aos pacientes não se expor ao sol ou utilizar outros produtos ou técnicas sem o conhecimento do profissional
- Pode aparecer coceira no dia da aplicação ou quatro a cinco dias depois, uma reação ao medicamento que passa espontaneamente. É frequente o aparecimento de hematomas e nódulos nos locais da aplicação. Drenagem linfática pode auxiliar no processo

Este documento foi elaborado com informações encaminhadas por nossos fornecedores e/ou pesquisadas em literaturas científicas, com o objetivo de orientar o profissional de saúde, devendo sempre ser analisadas pelo médico. Recomenda-se a pesquisa em outras referências científicas para a escolha da melhor conduta terapêutica.