

Gordura Localizada II

Gordura Localizada II PH 5,54

Benzopirona 1,5mg/mL	1 ampola 2mL
Troxerrutina 5%	2 ampolas 2mL
Procaína 4% + Cafeína 5%	1 ampola 2mL


Solução límpida amarelada

Via de Administração: Subcutânea

- A aplicação deve ser realizada nos locais com gordura localizada
- Agulha para aspiração: 30x0,8mm
- Agulha para aplicação: 13x0,3mm
- Seringa: 10mL

Indicação

Diminuição da gordura localizada



Componentes

Benzopirona	Atua no sistema circulatório e linfático
Troxerrutina	Melhora da microcirculação
Cafeína	Termogênico. Acelera o metabolismo
Procaína	Anestésico local

Protocolo

Realizar a aplicação subcutânea uma vez por semana ou a cada 72 horas. A duração do tratamento pode variar entre 8 a 12 semanas de acordo com o objetivo.

Procedimento para Aplicação

- Realizar a assepsia do local com álcool 70° e a delimitação das regiões
- Aspirar o conteúdo das ampolas da esquerda para a direita, devido ao pH das soluções (da solução mais alcalina para a mais ácida). (Agulha 30x0,8mm)
- Trocar a agulha para 13x0,3mm
- O volume total da solução é de 8mL
- Aplicar nos locais com gordura localizada 0,2 a 0,3mL da solução por ponto e um espaçamento mínimo de 1cm, agulha com angulação de 90°.

Observações

- Não realizar a aplicação do produto caso haja turvação e/ou precipitação da solução.
- Após a solubilização, a formulação deverá ser aplicada imediatamente.
- Durante o tratamento, é recomendado aos pacientes não se expor ao sol ou utilizar outros produtos ou técnicas sem o conhecimento do profissional.
- Pode aparecer coceira no dia da aplicação ou quatro a cinco dias depois, uma reação ao medicamento que passa espontaneamente. É frequente o aparecimento de hematomas e nódulos nos locais da aplicação. Drenagem linfática pode auxiliar no processo.